

حازم الطيبى

أستاذ جراحة العظام

دكتوراه جراحة تقويم العظام والكسور والروماتيزم

إستشاري جراحة تقويم تشوهات عظام الأطفال

نبذة عن مرض الشلل الدماغي Cerebral Palsy

معلومات هامة


- يحدث الشلل الدماغي نتيجة لنقص الأوكسجين الذي يغذى خلايا المخ عند الولادة أو بعد التهاب أو صابة مباشرة للدماغ مما ينتج عنه تلف خلايا المخ يؤدي إلى شلل لعضلات الجسم بنسب متفاوتة في الأطراف السفلية (مما يعيق المشي) أو الأطراف العلوية (مما يعيق استعمال اليدين).
- التشوه الذي يحدث يكون نتيجة لتقلص بعض العضلات مما يحدث انتثناء عند المفاصل وعدم قدرة على التحكم في الأطراف وتتدحر حاله المريض يوماً بعد يوم.
- تختلف الأعاقبة من طفل لأخر بحسب الجزء التالف من المخ ، اذا كان التلف بسيطاً عليه قد يصبح الطفل قادرًا على المشي شبه الطبيعي مع وجود اعوجاج غير ظاهر في القدم مثلاً أو معانقاً كلباً وطريح الفراش أو ملائم لكرسى متتحرك اذا كان التلف شديداً.
- العلاج الطبيعي هام في مسار العلاج لكن لا يغنى اطلاقاً عن التدخل الجراحي لوضع حد لتدحر الحاله.
- التدخل الجراحي لا يعيد الطفل إلى الوضع الطبيعي مثل اقرانه ولكن يحسن من الجهاز الحركي للمريض فإذا كان يستعمل جهازاً تعويضياً فيمكن الاستغناء عنه ، اذا كان يمشي بصعوبة فالجراحة تحسن من خطواته.
- في حالات الشلل الرباعي يرجى من الاهل عملأشعة على مفصل الفخذ (الحرقه) كل 6 شهور للأكتشاف المبكر لای خلع بالمفصل قبل حدوثه وحتى يتم التدخل الجراحي الفورى.
- الحركة المستمرة جزء هام في علاج مرض الشلل الدماغي قبل وبعد أجراء التدخل الجراحي.

العلاج الطبيعي


- ١- يبدأ العلاج الطبيعي منذ اليوم الأول بعد الجراحة.
- ٢- التمارين الخاصة بتقوية العضلة الرباعية هام جداً.
- ٣- العلاج المائي (بحمام السباحة) من أفضل طرق العلاج الطبيعي إذ يساعد على التوافق الحركي بين العضلات ويسرع من عودة الطفل إلى الوضع الطبيعي.
- ٤- يجب استعمال الجبائر تحت أرجل الركبة باستمرار حسب الحالة أثناء النوم أو توضع بالحناء اذا كان الطفل يستطيع المشي.
- ٥- يجب توفير وسيلة لمساعدة الطفل على المشي (مشابية - متوازيين) لأن مجرد الوقوف يحسن التوافق العضلي على الوضع الطبيعي.

التدخل الجراحي

- تجرى العمليات المطلوبة لجميع المفاصل في جلسة واحدة ويتم تصليح التشوهات بالكاحل والركبة والفخذ من تطويل ونقل أوتار أو قص عظمي وعمل جبس خفيف بعد العملية (فيبر جلاس).
- قد ينصح بإجراء العملية لحالات الشلل الرباعي لمنع تدحر الحاله ولتسهيل العناية أو لمنع حدوث خلع لمفصل الفخذ.
- بعد إجراء العملية ينصح بان يبدأ الطفل بمحاولة السير بالجنس الخفيف بعد أسبوعين.
- بعد رفع الجنس قد يحدث الم بالمفاصل وهذا أمر طبيعي ويذول بعد أيام من العلاج الطبيعي.
- من المنتظر حدوث تحسن للحالة بعد إجراء العملية من ٦ - ١٢ شهراً حسب حالة المريض والالتزام بتعليمات العلاج الطبيعي.



مشابية بعجل تساعده على المشي



متوازيين للسير بينهما